



NAXXID® Kautabletten

Medizinprodukt CE 0426

- ✓ **Reduziert den gastroösophagealen Reflux**
- ✓ **Mildert die Übersäuerung des Magens (Sodbrennen)**
- ✓ **Schützt die Magenschleimhaut**

1. Erscheinungsbild, Zusammensetzung und Wirkung

NAXXID® Kautabletten wirken dem gastroösophagealen Reflux, Sodbrennen und dem damit verbundenen Völlegefühl entgegen.

NAXXID® Kautabletten reduzieren die Übersäuerung des Magens und beugen Sodbrennen, Magenschmerzen und den damit verbundenen Verdauungsstörungen vor.

NAXXID® Kautabletten sind unabhängig von der Grunderkrankung wirksam und können bei Gastritis auch unterstützend angewendet werden.

1.1 Wirkmechanismus

NAXXID® Kautabletten enthalten eine Mischung verschiedener synergistischer Substanzen, die im gastrischen Milieu gemeinsam wirken. Alginat ist ein Polysaccharid, das aus bestimmten Algen gewonnen wird. Gelangt dieser Faserstoff erstmal in das saure Milieu des Magens, bewirkt er sehr schnell die Entstehung eines zähflüssigen, leichten Gels, welches die Magenschleimhaut bedeckt und schützt. Diese spezielle Formulierung aus Natriumalginat, Alginsäure und Bikarbonat sorgt für einen noch schnelleren Wirkungseintritt. Zudem erschwert das zähflüssige Alginat-Gel aufsteigende Bewegungen des Magens und senkt somit die Anzahl der Refluxepisoden. Die Mischung aus Karbonat und Bikarbonat neutralisiert die Magensäure. Darüber hinaus werden die bei der Reaktion entstehenden Kohlendioxid-Bläschen vom Alginatgel aufgefangen, welches in einen Schaum verwandelt wird; dieser Schaum schwimmt auf der Oberfläche der Magensäure.

1.2 Inhaltsstoffe

Jede Tablette enthält: Natriumalginat 200 mg, Alginsäure 50 mg, Natriumbikarbonat 80 mg, Kalziumkarbonat 140 mg.

Hilfsstoffe: Mannitol, Sucralose, Siliziumdioxid, pflanzliches Magnesiumstearat, Glycerolbehenat. Geschmacksstoffe: Ingwerextrakt, Ingweröl, Zitrone, Minze.

2. Verpackung

Eine Packung enthält 30 Tablette.

3. Dosierung und Art der Anwendung

Erwachsene (ab 12 Jahre): Es wird empfohlen, 2 Kautabletten nach jeder Hauptmahlzeit mit einem Glas Wasser einzunehmen.

Kinder (6-12 Jahre): Es wird empfohlen, 1 Kautablette nach jeder Hauptmahlzeit mit einem Glas Wasser einzunehmen. Diese Dosierungen sind wirksam, um der Magenübersäuerung entgegenzuwirken und den gastroösophagealen Reflux zu verhindern. Nehmen Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis ein.

4. Nebenwirkungen

In einschlägigen Tests wurde nachgewiesen, dass die Inhaltsstoffe sicher, vollständig biokompatibel und gut verträglich sind.

Bei den zur Erreichung der therapeutischen Wirkung notwendigen Dosierungen wurden lediglich Verstopfung bzw. vorübergehender Durchfall berichtet. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

5. Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln

Für die Inhaltsstoffe sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln bekannt.

Als allgemeine Regel sollen jedoch alle Nahrungsergänzungsmittel einschließlich Vitamine, Nährstoffe, pflanzliche und homöopathische Heilmittel mindestens ein Stunden vor oder nach der Anwendung von **NAXXID® Kautabletten** eingenommen werden.

5.1 Wechselwirkungen mit Arzneimitteln

Aufgrund seiner zähflüssigen Konsistenz kann das Medizinprodukt die Aufnahme gleichzeitig angewendeter Arzneimittel verzögern oder vermindern. Sprechen Sie daher mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit der Anwendung von **NAXXID® Kautabletten** beginnen, besonders wenn Sie die Anti-Baby-Pille verwenden. Es gibt keine Gegenanzeigen für die Verwendung **NAXXID® Kautabletten** mit pharmakologisch wirksamen Arzneistoffen wie Omeprazol, Cimetidin oder Cisaprid; dennoch sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen, wenn Sie solche Arzneistoffe gemeinsam mit **NAXXID® Kautabletten** verwenden.

6. Lagerung

Trocken bzw. fern von Hitze- oder Lichtquellen aufbewahren. **NAXXID® Kautabletten** nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Unter 25°C lagern.

7. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Nach Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker ist **NAXXID® Kautabletten** für Erwachsene über 18 Jahre geeignet. Es kann gelegentlich auch bei Kindern oder Jugendlichen angewendet werden; hierzu gilt der Warnhinweis, die Dosis bei 6- bis 12-Jährigen zu halbieren und **NAXXID® Kautabletten** unter ärztlicher Aufsicht zu verwenden.

Im Falle einer Schwangerschaft oder beim Stillen nicht verwenden.

Die empfohlene Dosis nicht überschreiten, denn höhere Dosierungen können zur Verstopfung oder zu vorübergehendem Durchfall führen. Bei chronischer Verstopfung oder chronischem Durchfall, Nierenerkrankung oder chronischer Herzinsuffizienz darf **NAXXID® Kautabletten** nicht verwendet werden. Verwenden Sie **NAXXID® Kautabletten** nicht länger als 30 Tage; bei anhaltenden Beschwerden sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Bewirkt **NAXXID® Kautabletten** auch nach längerer Anwendung keine deutliche Linderung der Beschwerden, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Jede Tablette ist zur einmaligen Verwendung vorgesehen und sollte erst unmittelbar vor der Einnahme geöffnet werden. Im Falle einer Unverträglichkeit sollten Sie **NAXXID® Kautabletten** nicht anwenden. Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe **NAXXID® Kautabletten** ebenfalls nicht angewendet werden.

8. Verfallsdatum

Verwenden Sie **NAXXID® Kautabletten** nicht nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum. Das Verfallsdatum bezieht sich auf das in der intakten Verpackung enthaltene Produkt.

9. Entsorgung

Das abgelaufene Produkt ist entsprechend den geltenden Abfallentsorgungsvorschriften zu entsorgen. Werfen Sie das Produkt oder seine Verpackung nicht einfach weg.

Vertrieb: ERWO Pharma GmbH, Europaring F08/101
2345 Brunn am Gebirge

NAXXID® und **CEUTICS®** sind eingetragene Schutzmarken von THE CEUTICS COMPANY GesmbH, Wien, Österreich.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.naxxid.com

